




EL VADO



Inicio y llegada → Panel informativo Avd. Castilla y León, enfrente de Bankia			El Vado	
horario	3h 30'		1	severidad del medio natural
desnivel de subida	218 m		2	orientación en el itinerario
desnivel de bajada	218 m		2	dificultad en el desplazamiento
distancia horizontal	12,3 Km		3	cantidad de esfuerzo necesario
tipo de recorrido	Circular			Sendero balizado

Condiciones de todo el año, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.



Medio.
Severidad del medio natural

- 1 El medio no está exento de riesgos
- 2 Hay más de un factor de riesgo
- 3 Hay varios factores de riesgo
- 4 Hay bastantes factores de riesgo
- 5 Hay muchos factores de riesgo



Itinerario.
Dificultad de orientarse en el itinerario

- 1 Caminos y cruces bien definidos
- 2 Sendas o señalización que indica la continuidad
- 3 Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales
- 4 Exige técnicas de orientación y navegación fuera de traza
- 5 La navegación es interrumpida por obstáculos que hay que bordear



Desplazamiento.
Dificultad en el desplazamiento

- 1 Marcha por superficie lisa
- 2 Marcha por caminos de herradura
- 3 Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares
- 4 Es preciso el uso de las manos para mantener el equilibrio
- 5 Requiere pasos de escalada para la progresión




Esfuerzo.
Cantidad de esfuerzo necesario

- 1 Hasta 1 h de marcha efectiva
- 2 Más de 1 h y hasta 3 h de marcha efectiva
- 3 Más de 3 h y hasta 6 h de marcha efectiva
- 4 Más de 6 h y hasta 10 h de marcha efectiva
- 5 Más de 10 h de marcha efectiva


Calculado según criterios MIDE para un excursionista medio poco cargado


Tipo de terreno

Asfalto	2,6 km
Carretera de tierra	3,9 km
Sendero	5,8 km



Perfil de elevación





INFORMACIÓN GEOLÓGICA, FLORA Y FAUNA

Ruta circular por la zona sur de Piedralaves. Caminaremos por dehesas, bosque de ribera y pinares.

La Dehesa se encuentra en pleno valle fluvial del Río Tiétar, distando en su parte inferior menos de un kilómetro del cauce del citado río. La roca madre existente es el granito típico del sistema central, a partir del cual se asienta un suelo en general permeable y con una alta pedregosidad superficial.

Sobre este suelo, se asienta una prolija vegetación, cuya especie principal es el rebollo, (*Quercus pyrenaica*), acompañado por Quejigos, (*Quercus faginea*), algún alcornoque aislado, (*Quercus suber*), pinos piñoneros, (*Pinus pinea*) y pinos albares, (*Pinus pinaster*), mientras que en las zonas más húmedas aparecen fresnos, (*Fraxinus angustifolia*). La fronda arbórea es variable, alternándose pastizales con importantes zonas donde la cobertura es total.

Respecto al estrato arbustivo y herbáceo, existen gran cantidad de especies, desde la jara (*Cistus ladanifer*), el majuelo (*Crataegus monogyna*), rosales silvestres, arrayanes, etc.. Las especies herbáceas son innumerables, destacando por su belleza los rosos (*Paeonia broteroï*) al igual que otras especies vivaces.



Se ha realizado un pequeño estudio de la fauna ornitológica existente, habiéndose detectado en una mañana unas 25 especies de pájaros diferentes, como águila calzada, herrerillo común ..etc. Los mamíferos citados son los típicos de un ecosistema de calidad, zorros, tejones, garduña, gineta etc...

Se ha realizado un pequeño estudio de la fauna ornitológica existente, habiéndose detectado en una mañana unas 25 especies de pájaros diferentes, como águila calzada, herrerillo común ..etc. Los mamíferos citados son los típicos de un ecosistema de calidad, zorros, tejones, garduña, gineta etc...

